Enjoy A Beautiful Lawn

Sta-Green®

LAWN WEED CONTROL

Control de maleza en el cesped

Controls Common Lawn Weeds Including Dandelion, Chickweed, Clover And More As Listed

Controla malezas comunes en el césped, incluyendo diente de león, pamplina, trébol y otras que figuran en la lista

Mata más de 150 tipos de malezas

Kills Over 150 Types of Weeds

Sta-Green

LAWN WEED CONTROL

Kills Over 150 Types of Weeds

COVERS 10,000 sq ft

FPO UPC
0 13013 02048 4

ACTIVE INGREDIENTS:

2,4-dichlorophenoxyacetic acid	1.37%
(+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid	0.31%
Dicamba: 3,6-dichloro-o-anisic acid	0.13%
INERT INGREDIENTS:	98.19%
TOTAL	100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:
27.4 lbs. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton.
6.2 lbs. (+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid equivalent per ton.
2.6 lbs. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton.
Isomer Specific by AOAC Methods
Contains the single isomer form of Mecoprop-p.
TRIMEC® is a registered trademark of PBI/Gordon Corporation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for Precautionary Statements.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Vea el reverso, para información sobre advertencias de precaución.

Money Back GUARANTEE

Net Wt 20 lb (9.0 kg)

Sta-Green

LAWN WEED CONTROL

Kills Over 150 Types of Weeds

COVERS 10,000 sq ft

THE STA-GREEN® PROMISE

YOUR SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY BACK!

If you apply Sta-Green Lawn Weed Control as directed and are not completely satisfied, send proof of purchase from this package and original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

STOP READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment area during application. Do not enter treatment area until spray has dried or dust has settled.

USE PRECAUTIONS

Do not allow the material to drift onto flowers, vegetables or ornamental shrubbery. Apply when the air is calm. Do not apply to newly seeded lawns. Do not apply in areas underlaid by roots of desirable trees and shrubs. Do not exceed specified dosages for any area; be particularly careful within dripline of tree and other ornamental species. During application, close spreader openings when turning. Do not contaminate domestic or irrigation waters.

INSTRUCTIONS

Sta-Green Lawn Weed Control controls a wide range of lawn weeds including dandelion, chickweed, knotweed, plantain, henbit, spurge and many others commonly found in home lawns. Possible re-treatment may be necessary if (a) lawn is heavily overrun by weeds, or (b) adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. A second application may be made in approximately 30 days.

For Use On

Established turf of warm season grasses includes bermudagrass, centipedegrass and zoysiagrass. Established turf of cool season grasses includes Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue and turf-type tall fescues. Do not apply this product on carpetgrass, dichondra, St. Augustinegrass or established turf containing desirable clovers.
The maximum application rate to turf is 1.2 lbs. 2,4-D acid equivalent per acre per application per site.
The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

1. Mow lawn to normal height 1 to 2 days before application.
2. Water lawn thoroughly at least 1 day before application to sustain moisture until the next watering (see step 4).
3. Apply when weeds are young and actively growing, preferably in the morning when dew is on the grass. If grass is not moist at time of application, sprinkle lightly with water to hold the material and prevent dust drift onto nontarget plants.
4. Do not wash from weed leaves for 1 to 2 days after application. At this time a thorough watering should be made.

WEEDS CONTROLLED

Annual yellow sweetclover
Aster
Austrian fieldcress
Bedstraw
Beggarticks
Betony, Florida
Bindweed, field
Bird vetch
Bitter wintercress
Bittercress, hairy
Bitterweed
Black-eyed Susan
Black medic
Black mustard
Blackseed plantain
Blessed thistle
Bloodflower milkweed
Blue lettuce
Blue vervain
Bracted plantain
Brassbuttons
Bristly oxtongue
Broadleaf dock
Broadleaf plantain
Broomweed
Buckhorn
Buckhorn plantain
Bulbous buttercup
Bull thistle
Bullnettle
Burclover
Burdock
Burning nettle
Burweed
Buttercup
Buttonweed
Canada thistle
Carolina geranium
Carpetweed
Catchweed bedstraw
Catnip
Catsear
Chickweed, common
Chickweed, mouseear
Chicory
Cinquefoil
Clover, crimson
Clover, hop
Clover, red
Clover, strawberry
Clover, sweet
Clover, white
Cocklebur
Common mullein
Creeping jenny
Cudweed
Curly dock
Daisy, English
Daisy fleabane
Daisy, oxeye
Dandelion
Dichondra
Dogbane
Dogfennel
Dollarweed
Elderberry
False dandelion
False flax
False sunflower
Fiddleneck
Florida pusley
Frenchweed
Galinsoga
Goathead
Goldenrod
Ground ivy
Gumweed
Hairy fleabane
Hawkweed
Healall
Heartleaf drymary
Heathaster
Hedge bindweed
Hedge mustard
Hemp
Henbit
Hoary cress
Hoary plantain
Hoary vervain
Horsenettle
Jimsonweed
Knawel
Knotweed
Kochia
Lambsquarters
Lespedeza
Mallow
Matchweed
Mexicanweed
Milk vetch
Morningglory
Mouseear hawkweed
Mugwort
Musk thistle
Mustard
Narrowleaf plantain
Narrowleaf vetch
Nettle
Orange hawkweed
Oriental cocklebur
Oxalis
Parsley-piert
Parsnip
Pearlwort
Pennycress
Pennywort
Peppergrass
Pepperweed
Pigweed
Pineywoods bedstraw
Plains coreopsis (tickseed)
Plantain
Poison ivy
Poison oak
Pokeweed
Poorjoe
Prairie sunflower
Prickly lettuce
Prickly sida
Prostrate knotweed
Prostrate pigweed
Prostrate spurge
Prostrate vervain
Puncturevine
Purslane, common
Ragweed
Red sorrel
Redroot pigweed
Redstem filaree
Rough cinquefoil
Rough fleabane
Russian pigweed
Russian thistle
Scarlet pimpernel
Scotch thistle
Sheep sorrel
Shepherdspurse
Slender plantain
Smallflower galinsoga
Smooth dock
Smooth pigweed
Sorrel
Sowthistle
Spanishneedles
Speedwell
Spiny amaranth
Spiny cocklebur
Spiny sowthistle
Spotted catsear
Spotted spurge
Spurweed
Stinging nettle
Strawberry, India mock
Tall nettle
Tall vervain
Tansy ragwort
Tansy mustard
Tanweed
Thistle
Trailing crownvetch
Tumble mustard
Tumble pigweed
Velvetleaf
Venice mallow
Virginia buttonweed
Virginia creeper
Virginia pepperweed
Wavyleaf bullthistle
Western clematis
Western salsify
White mustard
Wild aster
Wild buckwheat
Wild carrot
Wild four-o'clock
Wild garlic
Wild geranium
Wild lettuce
Wild marigold
Wild mustard
Wild onion
Wild parsnip
Wild radish
Wild rape
Wild strawberry
Wild sweet potato
Wild vetch
Woodsorrel
Woolly croton
Woolly morningglory
Woolly plantain
Wormseed
Yarrow
Yellow rocket
Yellowflower pepperweed and other broadleaf weeds

COVERAGE

To determine how much product you need to apply, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, garden, etc.). One bag covers 10,000 sq. ft.



_____ Length
x_____ Width
=_____ Total sq. ft.
-_____ Non-lawn areas
=_____ Total sq. ft. coverage needed

ROTARY SPREADERS

Ortho Rotary	3	Scotts SpeedyGreen 1000	7
True Temper	4	Scotts SpeedyGreen 2000	7
EV-N-SPRED 2600	14 ¼	Scotts SpeedyGreen 3000	7
Precision Rotary	5	Sta-Green SB5500	5 ½
Republic EZ Grow	3	Sta-Green SB4500	5 ½

DROP SPREADERS

Republic EZ	6 ¼
Ortho Drop	6 ¼
Precision Drop	6 ½
Scotts AccuGreen 1000	7
Scotts AccuGreen 2000	7
Scotts AccuGreen 3000	7
Sta-Green DS4500	2

Spreading Hints: The above spreader settings are approximate. Calibrate your spreader on 100 sq. ft. and adjust to apply at the rate of 1 lb. of product per 500 sq. ft. This bag covers 10,000 sq. ft. of lawn area.

IMPORTANT: It is important to follow the directions as indicated on this quality lawn care product as overapplication may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied and roughness of area treated. Be sure to check spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult Owner's Manual. *Never apply by hand.*

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store in original container and keep any bags containing unused product in a locked storage area inaccessible to children and domestic animals. Do not store near food or feedstuffs. **DISPOSAL: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partially filled:** Call your local solid waste agency or toll free number (1-800-CLEANUP) for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals
CAUTION: Harmful if swallowed. Do not inhale dust. Do not allow contact with skin, eyes or clothing. When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks and shoes.
After using this product, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water.

First Aid

If in eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If on skin or clothing:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.
For additional information in case of emergency, call toll free 1-877-341-9620.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:

Drift or runoff may adversely affect nontarget plants. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwater. Do not contaminate domestic or irrigation waters. Do not apply when weather conditions favor drift from target area.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.
When applied as directed, this product meets the guideline for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at **http://www.regulatory-info-sb.com.**


Sta-Green
Turf Note
PROPER MOWING PREVENTS WEEDS
The best way to control weeds is to mow the lawn properly. Close mowing or scalping encourages weeds. Mow your lawn as tall as recommended for the variety or grass type so that your lawn will suppress weeds naturally.

www.sta-green.com
LOOK!
for other quality Sta-Green lawn & garden products. For more information, visit us on our website at www.sta-green.com or call our Consumer Service Hotline at 1.877.341.9620.
¡BUSQUE!
otros productos de calidad de Sta-Green para el cuidado del césped y el jardín. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.sta-green.com o llame a nuestra línea de información para el cliente al 1.877.341.9620.
1-877-341-9620

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER
The manufacturer warrants only that the chemical composition of this product conforms to the ingredient statement given on the label, and that the product is reasonably suited for the labeled use when applied according to the Directions for Use.

THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. This limited warranty does not extend to the use of the product inconsistent with label instructions, warnings or cautions, or to use of the product under abnormal conditions such as drought, excessive rainfall, tornadoes, hurricanes, etc. These factors are beyond the control of the manufacturer or the seller. Any damages arising from a breach of the manufacturer's warranty shall be limited to direct damages, and shall not include indirect or consequential damages such as loss of profits or values, except as otherwise provided by law.

The terms of this Limited Warranty and Disclaimer cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or agent of the seller is authorized to vary or exceed the terms of this Limited Warranty and Disclaimer in any manner.

Manufactured for Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 2217-640-8845 EPA Est. Nos. 9198-OH-1(M), 9198-OH-2 (B), 9198-AL-1(A), 49991-TX-1(AZ), 49991-TX-2 (BC), 45065-MN-1(BD), 59144-GA-1(BE), 6665-NY-1(BF), 35512-FL-2(BG), 8378-IN-1(AS), 43854-MO-1(BH), 49710-TX-1(AT), 49710-TX-3(AU), 3234-UT-1(AV), 3234-AZ-1(AW), 74764-CA-1(BK), 74764-FL-1(BL), 9404-FL-1(AX), 35497-OR-1(AY), 8660-AL-1(BN), 8660-OH-1(BO)
Circled letter is first letter of lot number.
HG-11-10024 © 2006 UIC

Net Wt 20 lb (9.0 kg)

PROOF OF PURCHASE

UPC FPO
0 13013 02048 4

LA PROMESA DE STA-GREEN®

¡SATISFACCION GARANTIZADA O LA DEVOLUCION DE SU DINERO!

Si aplica la mezcla para el control de maleza en el césped de Sta-Green de acuerdo con las instrucciones y no queda completamente satisfecho, envíe el comprobante de compra de este paquete así como el recibo original de la caja registradora a la dirección que aparece más abajo. Le reembolsaremos el costo de su compra.

ALTO LEA PRIMERO TODA LA ETIQUETA. OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera diferente a las indicaciones de la etiqueta constituye una violación de las leyes federales.
No permita que personas (distintas a la persona que está aplicando el producto) o mascotas entren al área de tratamiento durante la aplicación. No ingrese al área de tratamiento hasta que el rociado se haya secado o el polvo se haya asentado.

PRECAUCIONES DE USO

No permita que el material drene hacia flores, vegetales o arbustos ornamentales. Aplique cuando no haya corrientes de aire. No aplique al césped recién sembrado. No aplique en áreas cimentadas con raíces de árboles y arbustos deseables. No exceda las dosificaciones especificadas para cualquier área; sea particularmente cuidadoso dentro de la línea de goteo de los árboles y otras especies ornamentales. Durante la aplicación, cierre las aperturas del esparcidor cuando esté girando. No contamine las aguas de uso doméstico o de irrigación.

INSTRUCCIONES

La mezcla para el control de maleza en el césped de Sta-Green controla un amplio rango de malezas del césped, incluyendo diente de león, pamplina, knotweed, llantén, ortiga mansa, lechetrenza y muchas otras encontradas comúnmente en los céspedes residenciales. Es posible que se necesite un nuevo tratamiento si (a) está muy invadido por las malezas o (b) prevalecen condiciones adversas de baja humedad y las malezas están en un estado deficiente de crecimiento. Puede hacerse una segunda aplicación en aproximadamente 30 días.

Para uso en

Céspedes establecidos con pastos de estación cálida incluyendo Bermudas, ciempiés y Zoysia. Céspedes establecidos con pastos de la estación fría incluyendo pasto azul de Kentucky, ryegrass perenne, festuca alta y festuca alta tipo césped. No aplique este producto sobre césped alfombra, dichondra, San Agustín o céspedes establecidos que contengan tréboles deseados.
El volumen de distribución máximo para un césped es equivalente a 544 gr (1.2 lbs.) de ácido 2,4-D por acre por aplicación por sitio.
El número máximo de aplicaciones por sitio de tratamiento es 2 por año.

1. Corte el césped a una altura normal, 1 a 2 días antes de la aplicación.
2. Riegue el césped completamente al menos un día antes de la aplicación para mantener la humedad hasta el siguiente riego (vea el paso 4).
3. Aplique cuando las malezas sean jóvenes y estén en crecimiento activo, preferentemente en la mañana cuando el rocío se encuentra sobre el pasto. Si el pasto no está húmedo en el momento de la aplicación, rocíe ligeramente con agua para mantener el material y prevenir que el polvo se pase a las plantas que no son el objetivo.
4. No lave las hojas de las malezas durante 1 a 2 días después de la aplicación. En este momento debe hacerse un riego minucioso.

MALEZAS CONTROLADAS

Abrojo (cabeza de cabra)
Acaricoba
Acedera menor
Aceitilla
Acetosa
Achicoria
Adelfa
Afata hembra
Ajo silvestre
Alazán
Alazán rojo
Alcotán
Aleluya
Alforjón silvestre
Algodoncillo flor de sangre
Almorta
Amaranto espinoso
Ambrosía
Ambrosía
Ambrosía de Virginia
Ambrosía y
Amsinckia menziesii var
Anicillo
Artemisa pegajosa
Arvejera de hoja delgada
Aster
Aster común
Aster silvestre
Astrágalo
Bardana
Berberecho
Berro de altura
Berro de invierno
Berro silvestre
Betónica de Florida
Bidente
Bledo procumbente
Bolsa de pastor
Caléndula silvestre
Camote silvestre
Cáñamo
Caperonia Palustris
Cardillo
Cardo
Cardo ajonjero
Cardo ajonjero espinoso
Cardo ajonjero oriental
Cardo almizclero
Cardo bendito
Cardo de Canadá
Cardo escocés
Cardo negro
Cardo perruno
Cardo ruso
Carraspique
Cebolla silvestre
Cenizos
Centinodia procumbente
Cerraja
Cerraja espinosa
Chiriquí
Chirivía
Chirivía silvestre
Clemátide occidental
Colza silvestre
Consueldo
Coreopsis (tickseed)
Correhuela mayor
Correhuela, campo
Cotula
Crotón pubescente
Dichondra
Diente de león
Diodia virginiana
Diosa teres
Enredadera (Polygonum Convolvulus)
Enredadera de campanillas
Enredadera de campanillas pubescente
Enredadera de Virginia
Erigerón
Escarola
Escleranto
Especie americana de solano
Espuela
Estramonio
Falso berro
Falso diente de león
Falso girasol
Falso lino
Francesa
Fresa de la India
Fresa silvestre
Galinsoga
Galinsoga smallflower
Galio
Galium aparine
Garranchuelo
Geranio de Carolina
Geranio silvestre
Girasol silvestre
Golondrina
Gordolobo común
Gutierrezia dracunculoides
Hiedra rastrera
Hierba cana
Hierba carmín
Hierba de botón
Hierba de gato peluda
Hierba de gato rugosa
Hierba de Santa Bárbara
Hierba del halcón
Hierba gatera
Hierba hormiguera
Ipecacuana blanca
Llantén de hoja ancha
Knotweed
Lechetrenza manchada
Lechetrezna procumbente
Lechuga azul
Lechuga silvestre
Lengua de vaca
Lepidio
Lippia
Llantén
Llantén canescente
Llantén con brácteas
Llantén de hoja ancha
Llantén de hoja delgada
Llantén de semilla negra
Llantén esbelto
Llantén menor
Llantén pubescente
Lysimachia nummularia
Malva
Malva de Venecia
Manzanilla loca
Margarita enana
Margarita, manzanilla loca
Mastuerzo canescente
Mirabilis Nyctaginea
Morenita
Mostaza
Mostaza blanca
Mostaza blanca
Mostaza caída
Mostaza negra
Mostaza seto
Mostaza silvestre
Naranja de la vellosilla
Ombligo de venus
Oreja de ratón
Ortiga
Ortiga de toro
Ortiga mansa
Ortiga mayor
Ortiga mayor
Ortiga urticante
otras malezas de
Pamplina, cerastium vulgatum
Pamplina, común
Pegapega
Perejil
Pilea nummulariifolia
Pimpinela escarlata
Pineywoods bedstraw
Quenopodio blanco
Quenopodio blanco
Quenopodio blanco ruso
Quenopodio caído
Quenopodio rojo
Quinquefolia
Quinquefolia rugosa
Rábano silvestre
Radícula austríaca
Ranúnculo
Ranúnculo bulboso
Roble venenoso
Roble venenoso (árbol de las pulgas)
Roseta francesa
Rudbeckia
Rumex altissimus
Sagina procumbens
Salsifí occidental
Sauco
Soliva pterosperma
Trailing crownvetch
Trébillo
Trébol blanco
Trébol carmesí
Trébol de carretilla
Trébol de los prados
Trébol dulce
Trébol fresa
Trébol lúpulo
Trébol rojo
Trifogonia verrucosa
Vara de San José
Velosilla
Verbena azul
Verbena canescente
Verbena lila
Verbena procumbente
Verdolaga, común
Verónica
Vicia americana
Wavyleaf bullthistle
Zanahoria silvestre
Zumaque venenoso

COBERTURA

Para determinar cuánto producto necesita aplicar, multiplique el largo por el ancho de su césped. Esto equivale al número total de metros cuadrados (pies cuadrados). Reste cualquier área no cubierta con césped (casa, jardín, etc.). Una bolsa cubre 929 metros cuadrados (10,000 pies cuadrados).



_____ Largo
x_____ Ancho
=_____ Total de metros cuadrados (pies cuadrados)
-_____ Areas no cubiertas con césped
=_____ Total de metros cuadrados (pies cuadrados) de cobertura necesaria

ESPARCIDORES POR ROTACION

Ortho Rotary	3	Scotts SpeedyGreen 1000	7
True Temper	4	Scotts SpeedyGreen 2000	7
EV-N-SPRED 2600	14 ¼	Scotts SpeedyGreen 3000	7
Precision Rotary	5	Sta-Green SB5500	5 ½
Republic EZ Grow	3	Sta-Green SB4500	5 ½

ESPARCIDORES POR GOTEO

Republic EZ	6 ¼
Ortho Drop	6 ¼
Precision Drop	6 ½
Scotts AccuGreen 1000	7
Scotts AccuGreen 2000	7
Scotts AccuGreen 3000	7
Sta-Green DS4500	2

Pautas de aspersión: Las configuraciones del esparcidor que se presentan arriba son aproximadas. Calibre su esparcidor sobre 9.3 metros cuadrados (100 pies cuadrados) y ajuste para aplicar a una concentración de 454 gr (1 lb) del producto por 46.5 metros (500 pies cuadrados). Esta bolsa cubre 929 metros cuadrados (10,000 pies cuadrados) de área cubierta con césped.

IIMPORTANTE: Es importante seguir las instrucciones indicadas en este producto de calidad para céspedes, ya que la aplicación excesiva puede causar daños a su césped. Las configuraciones del esparcidor son aproximadas. Pueden ocurrir diferencias debido al estado del esparcidor, la velocidad de aplicación y la aspereza del área tratada. Asegúrese de revisar el esparcidor antes de comenzar y de hacer los ajustes necesarios. Consulte el Manual del usuario. Nunca aplique con la mano.

Para evitar brechas y vetas, primero aplique en el borde del césped y luego llene hacia el centro pasando en forma uniforme y paralela. Camine manteniendo el paso de tal forma que se aplique uniformemente a lo largo de todo el césped.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

ALMACENAMIENTO: Almacene el recipiente original y mantenga cualquier bolsa que contenga producto sin utilizar en un área de almacenamiento bajo llave e inaccesible a niños y animales domésticos. No almacene cerca de alimentos o alimento para el ganado. **ELIMINACION: Si el envase está vacío:** no lo reutilice. Colóquelo en la basura o llévelo a un centro de reciclaje si existe la posibilidad. **Si está parcialmente lleno:** Póngase en contacto con su agencia local de desechos sólidos o llame al número gratuito (1-800-CLEANUP) para obtenar las instrucciones para su desecho. Nunca vierta el producto sin usar en drenajes interiores o exteriores.

ADVERTENCIAS DE PRECAUCIÓN

Este producto es peligroso para humanos y animales domésticos
PRECAUCIÓN: Es nocivo si se ingiere. No inhale el polvo. No permita el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Cuando utilice este producto, póngase una camisa de manga larga, pantalones largos, medias y zapatos.
Después de utilizar este producto, quítese la ropa y lávela separadamente antes de volver a usarla, y lave rápida y minuciosamente las manos y la piel expuesta con agua y jabón.

Primeros auxilios

Si entra en contacto con los ojos:	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y cuidadosamente con agua durante un lapso de 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, después continúe enjuagando el ojo. • Llame a un centro de atención toxicológica o a un médico para recibir información sobre el tratamiento a seguir.
Si entra en contacto con la piel o con la ropa:	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua, durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de atención toxicológica o a un médico para recibir información sobre el tratamiento a seguir.
Si traga el producto:	• Llame inmediatamente a un centro de atención toxicológica o a un médico para recibir información sobre el tratamiento a seguir. • Haga que la persona beba de un vaso de agua, si puede tragar. • No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de atención toxicológica o un médico. • No le administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Tenga con usted el envase del producto o la etiqueta al llamar a un centro de atención toxicológica o a un médico o si se dirige a un sitio de tratamiento. Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame al número gratuito 1-877-341-9620.

PELIGROS AMBIENTALES:

Los derrames o escurrimientos pueden afectar adversamente a las plantas que no son objetivo. No aplique el producto directamente en el agua. No contamine el agua desechando el agua empleada para lavar el equipo. No contamine las aguas de uso doméstico o de irrigación. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el drenaje fuera del área objetivo.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad de seguridad y del uso indebido de este producto si no se siguen las instrucciones indicadas.
Si este producto se aplica tal y como se especifica, cumple con los lineamientos sobre metales adoptados por la Asociación Estadounidense para el Control de Nutrientes para Plantas. Para obtener más información acerca del contenido y los niveles de metales de este producto, visite el sitio web **http://www.regulatory-info-sb.com.**

Sta-Green
Nota sobre el césped
UNA PODA ADECUADA PREVIENE LAS MALEZAS
La mejor forma de controlar las malezas es podar el césped apropiadamente. Una poda cerrada fomenta las malezas. Pode su césped a la altura recomendada para la variedad o tipo de pasto, de tal forma que este suprima las malezas naturalmente.

COVERS 10,000 sq ft

Sta-Green®

LAWN WEED CONTROL

Enjoy A Beautiful Lawn

LAWN WEED CONTROL

Kills Over 150 Types of Weeds

COVERS 10,000 sq ft

FPO UPC
0 13013 02048 4

LAWN WEED CONTROL

Control de maleza en el cesped

Controls Common Lawn Weeds Including Dandelion, Chickweed, Clover And More As Listed

Controla malezas comunes en el césped, incluyendo diente de león, pamplina, trébol y otras que figuran en la lista

Mata más de 150 tipos de malezas

Kills Over 150 Types of Weeds

LAWN WEED CONTROL

Kills Over 150 Types of Weeds

COVERS 10,000 sq ft

FPO UPC
0 13013 02048 4

ACTIVE INGREDIENTS:

2,4-dichlorophenoxyacetic acid	1.37%
(+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid	0.31%
Dicamba: 3,6-dichloro-o-anisic acid	0.13%
INERT INGREDIENTS:	98.19%
TOTAL	100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:
27.4 lbs. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton.
6.2 lbs. (+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid equivalent per ton.
2.6 lbs. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton.
Isomer Specific by AOAC Methods
Contains the single isomer form of Mecoprop-p.
TRIMEC® is a registered trademark of PBI/Gordon Corporation.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for Precautionary Statements.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN Vea el reverso, para información sobre advertencias de precaución.

Sta-Green®

Money Back GUARANTEE

Net Wt 20 lb (9.0 kg)

Sta-Green®

LAWN WEED CONTROL

Kills Over 150 Types of Weeds

COVERS 10,000 sq ft

THE STA-GREEN® PROMISE

YOUR SATISFACTION GUARANTEED OR YOUR MONEY BACK!

If you apply Sta-Green Lawn Weed Control as directed and are not completely satisfied, send proof of purchase from this package and original cash register receipt to the address below. We will refund the purchase price you paid.

STOP READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
Do not allow people (other than applicator) or pets on treatment area during application. Do not enter treatment area until spray has dried or dust has settled.

USE PRECAUTIONS

Do not allow the material to drift onto flowers, vegetables or ornamental shrubbery. Apply when the air is calm. Do not apply to newly seeded lawns. Do not apply in areas underlaid by roots of desirable trees and shrubs. Do not exceed specified dosages for any area; be particularly careful within dripline of tree and other ornamental species. During application, close spreader openings when turning. Do not contaminate domestic or irrigation waters.

INSTRUCTIONS

Sta-Green Lawn Weed Control controls a wide range of lawn weeds including dandelion, chickweed, knotweed, plantain, henbit, spurge and many others commonly found in home lawns. Possible re-treatment may be necessary if (a) lawn is heavily overrun by weeds, or (b) adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. A second application may be made in approximately 30 days.

For Use On

Established turf of warm season grasses includes bermudagrass, centipedegrass and zoysiagrass. Established turf of cool season grasses includes Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue and turf-type tall fescues. Do not apply this product on carpetgrass, dichondra, St. Augustinegrass or established turf containing desirable clovers.
The maximum application rate to turf is 1.2 lbs. 2,4-D acid equivalent per acre per application per site.
The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

1. Mow lawn to normal height 1 to 2 days before application.
2. Water lawn thoroughly at least 1 day before application to sustain moisture until the next watering (see step 4).
3. Apply when weeds are young and actively growing, preferably in the morning when dew is on the grass. If grass is not moist at time of application, sprinkle lightly with water to hold the material and prevent dust drift onto nontarget plants.
4. Do not wash from weed leaves for 1 to 2 days after application. At this time a thorough watering should be made.

WEEDS CONTROLLED

Annual yellow sweetclover
Aster
Austrian fieldcress
Bedstraw
Beggarticks
Betony, Florida
Bindweed, field
Bird vetch
Bitter wintercress
Bittercress, hairy
Bitterweed
Black-eyed Susan
Black medic
Black mustard
Blackseed plantain
Blessed thistle
Bloodflower milkweed
Blue lettuce
Blue vervain
Bracted plantain
Brassbuttons
Bristly oxtongue
Broadleaf dock
Broadleaf plantain
Broomweed
Buckhorn
Buckhorn plantain
Bulbous buttercup
Bull thistle
Bullnettle
Burclover
Burdock
Burning nettle
Burweed
Buttercup
Buttonweed
Canada thistle
Carolina geranium
Carpetweed
Catchweed bedstraw
Catnip
Catsear
Chickweed, common
Chickweed, mouseear
Chicory
Cinquefoil
Clover, crimson
Clover, hop
Clover, red
Clover, strawberry
Clover, sweet
Clover, white
Cockle
Cocklebur
Common mullein
Creeping jenny
Cudweed
Curly dock
Daisy, English
Daisy fleabane
Daisy, oxeye
Dandelion
Dichondra
Dogbane
Dogfennel
Dollarweed
Elderberry
False dandelion
False flax
False sunflower
Fiddleneck
Florida pusley
Frenchweed
Galinsoga
Goathead
Goldenrod
Ground ivy
Gumweed
Hairy fleabane
Hawkweed
Healall
Heartleaf drymary
Heathaster
Hedge bindweed
Hedge mustard
Hemp
Henbit
Hoary cress
Hoary plantain
Hoary vervain
Horsenettle
Jimsonweed
Knawel
Knotweed
Kochia
Lambsquarters
Lespedeza
Mallow
Matchweed
Mexicanweed
Milk vetch
Morningglory
Mouseear hawkweed
Mugwort
Musk thistle
Mustard
Narrowleaf plantain
Narrowleaf vetch
Nettle
Orange hawkweed
Oriental cocklebur
Oxalis
Parsley-piert
Parsnip
Pearlwort
Pennycress
Pennywort
Peppergrass
Pepperweed
Pigweed
Pineywoods bedstraw
Plains coreopsis (tickseed)
Plantain
Poison ivy
Poison oak
Pokeweed
Poorjoe
Prairie sunflower
Prickly lettuce
Prickly sida
Prostrate knotweed
Prostrate pigweed
Prostrate spurge
Prostrate vervain
Puncturevine
Purslane, common
Ragweed
Red sorrel
Redroot pigweed
Redstem filaree
Rough cinquefoil
Rough fleabane
Russian pigweed
Russian thistle
Scarlet pimpernel
Scotch thistle
Sheep sorrel
Shepherdspurse
Slender plantain
Smallflower galinsoga
Smooth dock
Smooth pigweed
Sorrel
Sowthistle
Spanishneedles
Speedwell
Spiny amaranth
Spiny cocklebur
Spiny sowthistle
Spotted catsear
Spotted spurge
Spurweed
Stinging nettle
Strawberry, India mock
Tall nettle
Tall vervain
Tansy ragwort
Tansy mustard
Tanweed
Thistle
Trailing crownvetch
Tumble mustard
Tumble pigweed
Velvetleaf
Venice mallow
Virginia buttonweed
Virginia creeper
Virginia pepperweed
Wavyleaf bullthistle
Western clematis
Western salsify
White mustard
Wild aster
Wild buckwheat
Wild carrot
Wild four-o'clock
Wild garlic
Wild geranium
Wild lettuce
Wild marigold
Wild mustard
Wild onion
Wild parsnip
Wild radish
Wild rape
Wild strawberry
Wild sweet potato
Wild vetch
Woodsorrel
Woolly croton
Woolly morningglory
Woolly plantain
Wormseed
Yarrow
Yellow rocket
Yellowflower pepperweed and other broadleaf weeds

COVERAGE

To determine how much product you need to apply, multiply the length of your lawn by its width. This equals your total square footage. Deduct any non-lawn areas (house, garden, etc.). One bag covers 10,000 sq. ft.



_____ Length
x_____ Width
=_____ Total sq. ft.
- _____ Non-lawn areas
=_____ Total sq. ft. coverage needed

LA PROMESA DE STA-GREEN®

¡SATISFACCION GARANTIZADA O LA DEVOLUCION DE SU DINERO!

Si aplica la mezcla para el control de maleza en el césped de Sta-Green de acuerdo con las instrucciones y no queda completamente satisfecho, envíe el comprobante de compra de este paquete así como el recibo original de la caja registradora a la dirección que aparece más abajo. Le reembolsaremos el costo de su compra.

ALTO LEA PRIMERO TODA LA ETIQUETA. OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.

INSTRUCCIONES DE USO

El uso de este producto de manera diferente a las indicaciones de la etiqueta constituye una violación de las leyes federales.
No permita que personas (distintas a la persona que está aplicando el producto) o mascotas entren al área de tratamiento durante la aplicación. No ingrese al área de tratamiento hasta que el rociado se haya secado o el polvo se haya asentado.

PRECAUCIONES DE USO

No permita que el material drene hacia flores, vegetales o arbustos ornamentales. Aplique cuando no haya corrientes de aire. No aplique al césped recién sembrado. No aplique en áreas cimentadas con raíces de árboles y arbustos deseables. No exceda las dosificaciones especificadas para cualquier área; sea particularmente cuidadoso dentro de la línea de goteo de los árboles y otras especies ornamentales. Durante la aplicación, cierre las aperturas del esparcidor cuando esté girando. No contamine las aguas de uso doméstico o de irrigación.

INSTRUCCIONES

La mezcla para el control de maleza en el césped de Sta-Green controla un amplio rango de malezas del césped, incluyendo diente de león, pamplina, knotweed, llantén, ortiga mansa, lechetrenza y muchas otras encontradas comúnmente en los céspedes residenciales. Es posible que se necesite un nuevo tratamiento si (a) está muy invadido por las malezas o (b) prevalecen condiciones adversas de baja humedad y las malezas están en un estado deficiente de crecimiento. Puede hacerse una segunda aplicación en aproximadamente 30 días.

Para uso en

Céspedes establecidos con pastos de estación cálida incluyendo Bermudas, ciempiés y Zoysia. Céspedes establecidos con pastos de la estación fría incluyendo pasto azul de Kentucky, ryegrass perenne, festuca alta y festuca alta tipo césped. No aplique este producto sobre césped alfombra, dichondra, San Agustín o céspedes establecidos que contengan tréboles deseados.
El volumen de distribución máximo para un césped es equivalente a 544 gr (1.2 lbs.) de ácido 2,4-D por acre por aplicación por sitio.
El número máximo de aplicaciones por sitio de tratamiento es 2 por año.

1. Corte el césped a una altura normal, 1 a 2 días antes de la aplicación.
2. Riegue el césped completamente al menos un día antes de la aplicación para mantener la humedad hasta el siguiente riego (vea el paso 4).
3. Aplique cuando las malezas sean jóvenes y estén en crecimiento activo, preferentemente en la mañana cuando el rocío se encuentra sobre el pasto. Si el pasto no está húmedo en el momento de la aplicación, rocíe ligeramente con agua para mantener el material y prevenir que el polvo se pase a las plantas que no son el objetivo.
4. No lave las hojas de las malezas durante 1 a 2 días después de la aplicación. En este momento debe hacerse un riego minucioso.

MALEZAS CONTROLADAS

Abrojo (cabeza de cabra)
Acariçoba
Acedera menor
Aceitilla
Acetosa
Achicoria
Adelfa
Alata hembra
Ajo silvestre
Alazán
Alazán rojo
Alcotán
Aleluya
Alfonjón silvestre
Algodoncillo flor de sangre
Almorta
Amaranto espinoso
Ambrosía
Ambrosía
Ambrosía de Virginia
Ambrosía y Amsinckia menziesii var
Anicillo
Artemisa pegajosa
Arvejera de hoja delgada
Aster
Aster común
Aster silvestre
Astrágalo
Bardana
Berberecho
Berro de altura
Berro de invierno
Berro silvestre
Betónica de Florida
Bidente
Bledo procumbente
Bolsa de pastor
Caléndula silvestre
Camote silvestre
Cáñamo
Caperonia Palustris
Cardillo
Cardo
Cardo ajonjero
Cardo ajonjero espinoso
Cardo ajonjero oriental
Cardo almizclero
Cardo bendito
Cardo de Canadá
Cardo escocés
Cardo negro
Cardo peruno
Cardo ruso
Carraspique
Cebolla silvestre
Cenizos
Centinodia procumbente
Cerraja
Cerraja espinosa
Chiriquí
Chirivía
Chirivía silvestre
Clemátide occidental
Colza silvestre
Consuelo
Coreopsis (tickseed)
Correhuela mayor
Correhuela, campo
Cotula
Crotón pubescente
Dichondra
Diente de león
Diodia virginiana
Diosa teres
Enredadera (Polygonum Convolvulus)
Enredadera de campanillas
Enredadera de campanillas pubescente
Enredadera de Virginia
Erigerón
Escarola
Escleranto
Especie americana de solano
Espuela
Estramonio
Falso berro
Falso diente de león
Falso girasol
Falso lino
Francesa
Fresa de la India
Fresa silvestre
Galinsoga
Galinsoga smallflower
Galio
Galium aparine
Garranchuelo
Geranio de Carolina
Geranio silvestre
Girasol silvestre
Golondrina
Gordolobo común
Gutierrezia dracunculoides
Hiedra rastrera
Hierba cana
Hierba carmín
Hierba de botón
Hierba de gato peluda
Hierba de gato rugosa
Hierba de Santa Bárbara
Hierba del halcón
Hierba gatera
Hierba hormiguera
Ipecacuana blanca
Llantén de hoja ancha
Knotweed
Lechetrenza manchada
Lechetrezna procumbente
Lechuga azul
Lechuga silvestre
Lengua de vaca
Lepidio
Lippia
Llantén
Llantén canescente
Llantén con bráctoas
Llantén de hoja ancha
Llantén de hoja delgada
Llantén de semilla negra
Llantén esbelto
Llantén menor
Llantén pubescente
Lysimachia nummularia
Malva
Malva de Venecia
Manzanilla loca
Margarita enana
Margarita, manzanilla loca
Mastuerzo canescente
Mirabilis Nyctaginea
Morenita
Mostaza
Mostaza blanca
Mostaza blanca
Mostaza caída
Mostaza negra
Mostaza seto
Mostaza silvestre
Naranja de la vellosilla
Ombligo de venus
Oreja de ratón
Ortiga
Ortiga de toro
Ortiga mansa
Ortiga mayor
Ortiga mayor
Ortiga urticante
otras malezas de Pamplina, cerastium vulgatum
Pamplina, común
Pegapega
Perejil
Pilea nummulariifolia
Pimpinela escarlata
Pineywoods bedstraw
Quenopodio blanco
Quenopodio blanco
Quenopodio blanco ruso
Quenopodio caído
Quenopodio rojo
Quinquefolia
Quinquefolia rugosa
Rábano silvestre
Radícula austríaca
Ranúnculo
Ranúnculo bulboso
Roble venenoso
Roble venenoso (árbol de las pulgas)
Roseta francesa
Rudbeckia
Rumex altissimus
Sagina procumbens
Salsifí occidental
Sauco
Soliva pterosperma
Trailing crownvetch
Trebillo
Trébol blanco
Trébol carmesí
Trébol de carretilla
Trébol de los prados
Trébol dulce
Trébol fresa
Trébol lúpulo
Trébol rojo
Tritogonia verrucosa
Vara de San José
Velosilla
Verbena azul
Verbena canescente
Verbena lila
Verbena procumbente
Verdolaga, común
Verónica
Vicia americana
Wavyleaf bullthistle
Zanahoria silvestre
Zumaque venenoso

COBERTURA

Para determinar cuánto producto necesita aplicar, multiplique el largo por el ancho de su césped. Esto equivale al número total de metros cuadrados (pies cuadrados). Reste cualquier área no cubierta con césped (casa, jardín, etc.). Una bolsa cubre 929 metros cuadrados (10,000 pies cuadrados).



_____ Largo
x_____ Ancho
=_____ Total de metros cuadrados (pies cuadrados)
- _____ Areas no cubiertas con césped
=_____ Total de metros cuadrados (pies cuadrados) de cobertura necesaria

ROTARY SPREADERS				DROP SPREADERS	
Ortho Rotary	3	Scotts SpeedyGreen 1000	7	Republic EZ	6 ¼
True Temper	4	Scotts SpeedyGreen 2000	7	Ortho Drop	6 ¼
EV-N-SPRED 2600	14 ¼	Scotts SpeedyGreen 3000	7	Precision Drop	6 ½
Precision Rotary	5	Sta-Green SB5500	5 ½	Scotts AccuGreen 1000	7
Republic EZ Grow	3	Sta-Green SB4500	5 ½	Scotts AccuGreen 2000	7
				Scotts AccuGreen 3000	7
				Sta-Green DS4500	2

Spreading Hints: The above spreader settings are approximate. Calibrate your spreader on 100 sq. ft. and adjust to apply at the rate of 1 lb. of product per 500 sq. ft. This bag covers 10,000 sq. ft. of lawn area.

IMPORTANT: It is important to follow the directions as indicated on this quality lawn care product as overapplication may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied and roughness of area treated. Be sure to check spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult Owner's Manual. *Never apply by hand.*

To avoid gaps and streaks, first spread border of lawn and then fill in center with uniform, parallel passes. Walk at a steady pace so as to apply evenly throughout the lawn.

ESPARCIDORES POR ROTACION				ESPARCIDORES POR GOTEO	
Ortho Rotary	3	Scotts SpeedyGreen 1000	7	Republic EZ	6 ¼
True Temper	4	Scotts SpeedyGreen 2000	7	Ortho Drop	6 ¼
EV-N-SPRED 2600	14 ¼	Scotts SpeedyGreen 3000	7	Precision Drop	6 ½
Precision Rotary	5	Sta-Green SB5500	5 ½	Scotts AccuGreen 1000	7
Republic EZ Grow	3	Sta-Green SB4500	5 ½	Scotts AccuGreen 2000	7
				Scotts AccuGreen 3000	7
				Sta-Green DS4500	2

Pautas de aspersión: Las configuraciones del esparcidor que se presentan arriba son aproximadas. Calibre su esparcidor sobre 9.3 metros cuadrados (100 pies cuadrados) y ajuste para aplicar a una concentración de 454 gr (1 lb) del producto por 46.5 metros (500 pies cuadrados). Esta bolsa cubre 929 metros cuadrados (10,000 pies cuadrados) de área cubierta con césped.

IIMPORTANTE: Es importante seguir las instrucciones indicadas en este producto de calidad para céspedes, ya que la aplicación excesiva puede causar daños a su césped. Las configuraciones del esparcidor son aproximadas. Pueden ocurrir diferencias debido al estado del esparcidor, la velocidad de aplicación y la aspereza del área tratada. Asegúrese de revisar el esparcidor antes de comenzar y de hacer los ajustes necesarios. Consulte el Manual del usuario. Nunca aplique con la mano.

Para evitar brechas y vetas, primero aplique en el borde del césped y luego llene hacia el centro pasando en forma uniforme y paralela. Camine manteniendo el paso de tal forma que se aplique uniformemente a lo largo de todo el césped.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store in original container and keep any bags containing unused product in a locked storage area inaccessible to children and domestic animals. Do not store near food or feedstuffs. **DISPOSAL: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partially filled:** Call your local solid waste agency or toll free number (1-800-CLEANUP) for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if swallowed. Do not inhale dust. Do not allow contact with skin, eyes or clothing. When using this product, wear long-sleeved shirt, long pants, socks and shoes.

After using this product, remove clothing and launder separately before reuse, and promptly and thoroughly wash hands and exposed skin with soap and water.

First Aid	
If in eyes:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If on skin or clothing:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
If swallowed:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment.
For additional information in case of emergency, call toll free 1-877-341-9620.

ENVIRONMENTAL HAZARDS:

Drift or runoff may adversely affect nontarget plants. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwater. Do not contaminate domestic or irrigation waters. Do not apply when weather conditions favor drift from target area.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

When applied as directed, this product meets the guideline for metals adopted by the Association of American Plant Food Control Officials. Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at **http://www.regulatory-info-sb.com.**

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

ALMACENAMIENTO: Almacene el recipiente original y mantenga cualquier bolsa que contenga producto sin utilizar en un área de almacenamiento bajo llave e inaccesible a niños y animales domésticos. No almacene cerca de alimentos o alimento para el ganado. **ELIMINACION: Si el envase está vacío:** no lo reutilice. Colóquelo en la basura o llévelo a un centro de reciclaje si existe la posibilidad. **Si está parcialmente lleno:** Póngase en contacto con su agencia local de desechos sólidos o llame al número gratuito (1-800-CLEANUP) para obtenar las instrucciones para su desecho. Nunca vierta el producto sin usar en drenajes interiores o exteriores.

ADVERTENCIAS DE PRECAUCIÓN

Este producto es peligroso para humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN: Es nocivo si se ingiere. No inhale el polvo. No permita el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Cuando utilice este producto, póngase una camisa de manga larga, pantalones largos, medias y zapatos.

Después de utilizar este producto, quítese la ropa y lávela separadamente antes de volver a usarla, y lave rápida y minuciosamente las manos y la piel expuesta con agua y jabón.

Primeros auxilios	
Si entra en contacto con los ojos:	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y cuidadosamente con agua durante un lapso de 15 a 20 minutos. • Si usa lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, después continúe enjuagando el ojo. • Llame a un centro de atención toxicológica o a un médico para recibir información sobre el tratamiento a seguir.
Si entra en contacto con la piel o con la ropa:	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua, durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de atención toxicológica o a un médico para recibir información sobre el tratamiento a seguir.
Si traga el producto:	• Llame inmediatamente a un centro de atención toxicológica o a un médico para recibir información sobre el tratamiento a seguir. • Haga que la persona beba de un vaso de agua, si puede tragar. • No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de atención toxicológica o un médico. • No le administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

Tenga con usted el envase del producto o la etiqueta al llamar a un centro de atención toxicológica o a un médico o si se dirige a un sitio de tratamiento. Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame al número gratuito 1-877-341-9620.

PELIGROS AMBIENTALES:

Los derrames o escurrimientos pueden afectar adversamente a las plantas que no son objetivo. No aplique el producto directamente en el agua. No contamine el agua desechando el agua empleada para lavar el equipo. No contamine las aguas de uso doméstico o de irrigación. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el drenaje fuera del área objetivo.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad de seguridad y del uso indebido de este producto si no se siguen las instrucciones indicadas.

Si este producto se aplica tal y como se especifica, cumple con los lineamientos sobre metales adoptados por la Asociación Estadounidense para el Control de Nutrientes para Plantas. Para obtener más información acerca del contenido y los niveles de metales de este producto, visite el sitio web **http://www.regulatory-info-sb.com.**

Sta-Green Turf Note

PROPER MOWING PREVENTS WEEDS

The best way to control weeds is to mow the lawn properly. Close mowing or scalping encourages weeds. Mow your lawn as tall as recommended for the variety or grass type so that your lawn will suppress weeds naturally.

www.sta-green.com

LOOK! for other quality Sta-Green lawn & garden products. For more information, visit us on our website at www.sta-green.com or call our Consumer Service Hotline at 1.877.341.9620.

¡BUSQUE! otros productos de calidad de Sta-Green para el cuidado del césped y el jardín. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.sta-green.com o llame a nuestra línea de información para el cliente al 1.877.341.9620.

1-877-341-9620

Sta-Green Nota sobre el césped

UNA PODA ADECUADA PREVIENE LAS MALEZAS

La mejor forma de controlar las malezas es podar el césped apropiadamente. Una poda cerrada fomenta las malezas. Pode su césped a la altura recomendada para la variedad o tipo de pasto, de tal forma que este suprima las malezas naturalmente.

LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER

The manufacturer warrants only that the chemical composition of this product conforms to the ingredient statement given on the label, and that the product is reasonably suited for the labeled use when applied according to the Directions for Use.

THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. This limited warranty does not extend to the use of the product inconsistent with label instructions, warnings or cautions, or to use of the product under abnormal conditions such as drought, excessive rainfall, tornadoes, hurricanes, etc. These factors are beyond the control of the manufacturer or the seller. Any damages arising from a breach of the manufacturer's warranty shall be limited to direct damages, and shall not include indirect or consequential damages such as loss of profits or values, except as otherwise provided by law.

The terms of this Limited Warranty and Disclaimer cannot be varied by any written or verbal statements or agreements. No employee or agent of the seller is authorized to vary or exceed the terms of this Limited Warranty and Disclaimer in any manner.

Manufactured for Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 2217-640-8845 EPA Est. Nos. 9198-OH-1(M), 9198-OH-2 (B), 9198-AL-1(A), 49991-TX-1(AZ), 49991-TX-2 (BC), 45065-MN-1(BD), 59144-GA-1(BE), 6665-NY-1(BF), 35512-FL-2(BG), 8378-IN-1(AS), 43854-MO-1(BH), 49710-TX-1(AT), 49710-TX-3(AU), 3234-UT-1(AV), 3234-AZ-1(AW), 74764-CA-1(BK), 74764-FL-1(BL), 9404-FL-1(AX), 35497-OR-1(AY), 8660-AL-1(BN), 8660-OH-1(BO)

Circled letter is first letter of lot number.

HG-11-10024 © 2006 UIC

Net Wt 20 lb (9.0 kg)

PROOF OF PURCHASE

UPC FPO
0 13013 02048 4

COVERS 10,000 sq ft